

ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России  
(Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России)

Россия, 123098, г. Москва,  
ул. Гамалеи, 18;

тел. (499) 193-30-50, (499) 190-44-59;  
факс (499) 190-66-71.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации  
\_\_\_\_\_ Г.Г. Онищенко  
« 26 » июня 2007 г.  
№ 01-11/101-07

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Анатоксина стафилококкового очищенного

**Лекарственная форма.** Раствор для подкожного введения.

Анатоксин стафилококковый очищенный представляет собой токсин стафилококковый обезвреженный формалином и теплом, очищенный от балластных белков.

1,0 мл препарата содержит от 10 до 14 ЕС (единиц связывания) стафилококкового анатоксина.

Препарат не содержит консервантов и антибиотиков.

Прозрачная жидкость бесцветная или светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа: МИБП**

**Иммунологические свойства.** Препарат вызывает образование специфических антител против экзотоксина стафилококкового.

**Показания к применению.** Специфическая иммунотерапия острой и хронической (в стадии обострения) стафилококковой инфекции у взрослых.

**Противопоказания.** Противопоказаниями для применения анатоксина стафилококкового очищенного, являются: острые инфекционные и неинфекционные заболевания не стафилококковой этиологии, хронические заболевания не стафилококковой этиологии в стадии обострения или декомпенсации – прививки проводят не ранее чем через 1 месяц после выздоровления (ремиссии).

С осторожностью применять, при наличии в анамнезе тяжелых аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке); в период беременности (т.к. нет достаточных данных о безопасности применения препарата у беременных женщин).

**Способ применения и дозы.** Анатоксин стафилококковый, очищенный вводят подкожно под нижний угол лопатки, чередуя правую и левую стороны при каждой последующей инъекции. Внутримышечное применение препарата не допускается.

Не пригоден к применению препарат, содержащийся в ампулах с нарушенной целостностью, маркировкой, при изменении физических свойств (наличие мути, хлопьев), с истекшим сроком годности, с нарушением условий хранения. Вскрытие ампул и введение препарата больным осуществляют при строгом соблюдении правил асептики и антисептики.

Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Полный курс лечения включает 7 инъекций препарата, осуществляемых с интервалом 2 дня, в следующих возрастающих дозах: 0,1-0,3-0,5-0,7-0,9-1,2-1,5 мл.

При быстром клиническом эффекте курс терапии по усмотрению лечащего врача может быть сокращен до 5 инъекций.

**Побочное действие.** Введение препарата может сопровождаться общими, местными и очаговыми реакциями.

Общие реакции характеризуются легкой слабостью, недомоганием, изредка повышением температуры до 37,5 °С.

Для местных реакций характерны гиперемия и легкая болезненность в месте инъекции, исчезающие через 1-2 дня.

Нередко после инъекции препарата может иметь место очаговая реакция, т.е. обострение процесса в месте его локализации.

Возникновение указанных реакций не является противопоказанием для продолжения лечения. Однако при наличии одновременно общих и местных реакций интервал между предыдущей и последующей инъекциями препарата рекомендуется увеличить на 1 день. Развитие очаговой реакции не требует увеличения интервала между инъекциями.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Лечение анатоксином стафилококковым очищенным может проводиться одновременно с другой общей и местной терапией, за исключением иммуноглобулинов и антистафилококковой плазмы.

**Форма выпуска.** В ампулах по 1,0 мл. Пачка содержит 10 ампул и инструкцию по применению.

**Транспортирование.** В соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.

**Условия хранения.** В соответствии с СП 3.3.2. 1248-03 при температуре от 2 до 8 °С в сухом, защищенном от света месте. Замораживание не допускается.

**Условия отпуска.** Для лечебно-профилактических учреждений.

**Срок годности.** Срок годности – 2 года.

**Производитель/претензии потребителей направлять по адресу:**

ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России (Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.